


ZÁVERY A ODPORÚČANIA
z odborného lesníckeho seminára

„Zachovajme dub a jedľu aj pre budúce generácie“

pod odbornou garanciou

prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. a doc. Ing. Igora Štefančíka, CSc.



KOŠICKÁ BELÁ
6. - 7. september 2018

ZÁVERY A ODPORÚČANIA
Z ODBORNÉHO LESNÍCKEHO SEMINÁRA
„ZACHOVAJME DUB A JEDĽU AJ PRE BUDÚCE GENERÁCIE“
pre lesnícku prax

Základné zásady pre úspešné pestovanie duba:

- Vzhľadom na meniace sa ekologické podmienky, zhoršujúci sa zdravotný stav lesov je potrebné do budúcnosti vytvoriť resp. dotvárať trvale stabilný dubový les. V pôvodne zmiešaných lesných ekosystémoch s dominanciou duba zimného udržiavať zmiešanie už na malých čiastkových plochách. Prístup k lesu treba chápať komplexne ako prístup ku ucelenému jednotnému lesnému ekosystému pri udržovaní vyrovnaného lesného prostredia t.z. typickej lesnej klímy, regulácii zrážok a pôdnych pomerov.
- Pri prirodzenej obnove dubových porastov resp. zmiešaných porastov s dominantným zastúpením duba zimného semenný rub realizovať v nasledovnom roku po semennej úrode spravidla po objavení sa semenáčikov duba s prihliadnutím na podporu kvalitných stromov a so zameraním na zvýšenie hodnotovej produkcie porastu .
- Pri obnove porastov uplatňovať maloplošné formy skupinovite clonných obnovných rubov do výmery maximálne 0,20 ha. Vzďialenosť skupín prispôbiť dynamike obnovy s minimálnym limitom vzďialenosti na priemernú výšku porastu.
- V problematických lokalitách využívať sadbu a hlavne sejbu z kvalitných zdrojov reprodukčného materiálu.
- Na obnovovaných plochách so zastúpením duba zimného a hraba obyčajného citlivo pracovať so svetlom, hlavne cez využitie stromov podúrovne, s cieľom pomoci dubu na úkor hraba,
- Zabezpečiť významné zníženie stavu diviačej zveri, budovať oplôtky na ochranu pred zverou.
- Rubnú dobu dubových porastov resp. zmiešaných porastov s dominantným zastúpením duba zimného posunúť na 150 rokov ,predĺžiť celkové obnovné doby , s tým maximálne využiť rôzne dĺžky čiastkových obnovných dôb so zámerom dosiahnutia významnej plošnej a vekovej diferenciacie duba.
- Odstraňovať z porastu jedince s poškodenými korunami, najkvalitnejšie zdravé jedince udržať v poraste čo najdlhšie až do dosiahnutia maximálnej ceny na trhu.

Odporúčania pri výchove :

Výchova mladín:

- Rozčlenenie porastu (linky, pracovné polia).
- Neodporúčajú sa silnejšie zásahy v dlhších časových intervaloch.
- Zásada: včas, mierne a častejšie.
- Zásah do hornej vrstvy, v prehustených porastoch aj do strednej vrstvy.
- Negatívny výber v hornej vrstve, odstraňovanie tvarovo nevhodných a predrastavých jedincov.
- Zachovať dokonalý zápoj. Sila zásahu 2 až 10 %.
- V hustejších mladinách z prirodzenej obnovy na vhodných stanovištiach využiť neceloplošnú výchovu.

Výchova žŕdkovín a žrd'ovín:

- Zamerať sa na kvalitu produkcie.
- Zásahy včasné, systematické a miernejšie.
- Prebierky úrovňové s pozitívnym výberom.
- Sila zásahu 10-15 % zo zásoby pri počte 100 (150) až 200 cieľových stromov.
- Neskôr 150 CS s intervalom 8-10 rokov.
- Ponechávať jedince podúrovne, kvôli čisteniu kmeňa (dub, hrab, iné dreviny).
- Metóda nádejných stromov, neskôr metóda cieľových (budúcich rubných stromov).

Základné zásady obhospodarovania porastov s cieľom zachovania resp. zvýšenia podielu jedle :

- Pre zachovanie jedle bude potrebné využívať jej prirodzený rastový rytmus . Cez počiatkový primerane dlhý rastový útlm dosahovať vytrvalejší rast, zlepšenie kvality a silnejších dimenzií. Systematickou pestovnou starostlivosťou o porastovú zásobu zlepšovať kvalitu produkcie. Uplatňovať princíp trvalého zušľacht'ovacieho výberu. Rubnú zrelosť nevzťahovať na celý porast, ale na jednotlivé stromy.
- Využívať dôslednejšie jej individuálne rastové aj hodnotovo-produkčné schopnosti . Dodržiavať vysoký stupeň pestovnej ale aj ťažbovej voľnosti v záujme úzkeho prepojenia ťažby-výchovy-obnovy do kontinuálneho sledu.
- Pri obnove jedle uplatňovať najmenejšie obnovné ruby s dlhou obnovnou dobou/30-40 rokov/ skupinový clonný rub,Bádenský clonný rub, prípadne účelový výber -stromová a skupinová forma, vytvárať predpoklady pre vznik mozaikových vertikálne diferencovaných porastov.
- Zmladenie jedle uvoľňovať s prihliadnutím na kulmináciu hodnotového prírastku zostávajúcich stromov materského porastu.
- V problematických lokalitách uvažovať aj s podsadbou resp. predsadbou jedle v hlúčkoch.
- Zabezpečiť jednoznačnú a dôslednú ochranu proti vysokej zveri /repelenty, oplotky/, zabezpečiť dôsledný poľovný manažment na dosiahnutie únosného stavu jelenej zveri.